



DESINFEKTIONSTÜCHER PLUS

Inhalt: 100 Tücher aus PP/VIS-Mischgewebe, 12 cm x 20 cm, 230 ml Desinfektionslösung

REF 200 735

☑️ **DISINFECTANT WIPES PLUS**
Content: 100 wipes made of PP/VIS mixed fabric, 12 cm x 20 cm, 230 ml of disinfectant solution

☑️ **LINGETTES DÉINFECTANTES PLUS**
Contenu : 100 lingettes en PP/VIS mélangé, 12 cm x 20 cm, 230 ml de solution désinfectante

☑️ **SALVIETTE DISINFETTANTI PLUS**
Contenuto: 100 salviette in tessuto misto PP/VIS, 12 cm x 20 cm, 230 ml di soluzione disinfettante

☑️ **DEZINFEKČNÍ UBRUSKY PLUS**
Obsah: 100 ubrusků ze směsotv tkaniny PP/VIS, 12 cm x 20 cm, dezinfekčního roztoku 230 ml

☑️ **FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ PLUS**
Tartalma: 100 db kendő, 12 cm x 20 cm nagyságú PP/VIS összetételű, 230 ml fertőtlenítőes oldattal átítva.

Beutel geöffnet am/Bag opened on:

Halbbarkeitsdatum/Use-by date:

Unterschrift/Signature:

Gefahr/Danger/Pericolo/Nebezpečí/Veszély



100°C

LOT

Siehe Aufdruck

0124

PRISMAN GmbH · Otto-Hahn-Ring 6-18 · D-64653 Lorsch · Tel.: +49 (0) 6251-86 69 80-0

M+W Dental Vertrieb durch Müller & Weyandt GmbH · Reichardsweide 40

D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88

☑️ **Art der Anwendung: Gemäß MPG:** Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. **Gemäß Biocid-Verordnung:** Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. **Hinweise zur Anwendung:** Den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Entnahmehalter. Das Tuch in die Mitte der Wärmehülle einziehen und von unten durch den Stern im Deckelbereich schieben. Danach den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (z.B. für Acrylglas nicht geeignet). Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels nur für 28 Tage in ungeöffneten Behältern verwendbar. Das Haltbarkeitsdatum, sowie die gestrichelten Hinweise der Tränklingsigkeit sind zu beachten und auf ein Etikett zur äußeren Kennzeichnung des Behälters zu übertragen. Nach Entnahme eines Tuchs ist der Behälter wieder sorgfältig und dicht zu verschließen. Die Aufbereitung des Entnahmehalters ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungsanweisung mit einem geeigneten Desinfektionsmittel durchzuführen. **Einwirkzeiten** (bezogen auf die Tränklingsigkeit):

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. TB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terre) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Behälter und Deckel trocken lassen ☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Art der Anwendung: Gemäß MPG:** Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. **Gemäß Biocid-Verordnung:** Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. **Hinweise zur Anwendung:** Den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Entnahmehalter. Das Tuch in die Mitte der Wärmehülle einziehen und von unten durch den Stern im Deckelbereich schieben. Danach den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (z.B. für Acrylglas nicht geeignet). Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels nur für 28 Tage in ungeöffneten Behältern verwendbar. Das Haltbarkeitsdatum, sowie die gestrichelten Hinweise der Tränklingsigkeit sind zu beachten und auf ein Etikett zur äußeren Kennzeichnung des Behälters zu übertragen. Nach Entnahme eines Tuchs ist der Behälter wieder sorgfältig und dicht zu verschließen. Die Aufbereitung des Entnahmehalters ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungsanweisung mit einem geeigneten Desinfektionsmittel durchzuführen. **Einwirkzeiten** (bezogen auf die Tränklingsigkeit):

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. TB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terre) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Behälter und Deckel trocken lassen ☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Art der Anwendung: Gemäß MPG:** Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. **Gemäß Biocid-Verordnung:** Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. **Hinweise zur Anwendung:** Den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Entnahmehalter. Das Tuch in die Mitte der Wärmehülle einziehen und von unten durch den Stern im Deckelbereich schieben. Danach den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (z.B. für Acrylglas nicht geeignet). Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels nur für 28 Tage in ungeöffneten Behältern verwendbar. Das Haltbarkeitsdatum, sowie die gestrichelten Hinweise der Tränklingsigkeit sind zu beachten und auf ein Etikett zur äußeren Kennzeichnung des Behälters zu übertragen. Nach Entnahme eines Tuchs ist der Behälter wieder sorgfältig und dicht zu verschließen. Die Aufbereitung des Entnahmehalters ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungsanweisung mit einem geeigneten Desinfektionsmittel durchzuführen. **Einwirkzeiten** (bezogen auf die Tränklingsigkeit):

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. TB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terre) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Behälter und Deckel trocken lassen ☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Art der Anwendung: Gemäß MPG:** Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. **Gemäß Biocid-Verordnung:** Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. **Hinweise zur Anwendung:** Den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Entnahmehalter. Das Tuch in die Mitte der Wärmehülle einziehen und von unten durch den Stern im Deckelbereich schieben. Danach den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (z.B. für Acrylglas nicht geeignet). Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels nur für 28 Tage in ungeöffneten Behältern verwendbar. Das Haltbarkeitsdatum, sowie die gestrichelten Hinweise der Tränklingsigkeit sind zu beachten und auf ein Etikett zur äußeren Kennzeichnung des Behälters zu übertragen. Nach Entnahme eines Tuchs ist der Behälter wieder sorgfältig und dicht zu verschließen. Die Aufbereitung des Entnahmehalters ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungsanweisung mit einem geeigneten Desinfektionsmittel durchzuführen. **Einwirkzeiten** (bezogen auf die Tränklingsigkeit):

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. TB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terre) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Behälter und Deckel trocken lassen ☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Art der Anwendung: Gemäß MPG:** Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. **Gemäß Biocid-Verordnung:** Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. **Hinweise zur Anwendung:** Den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Entnahmehalter. Das Tuch in die Mitte der Wärmehülle einziehen und von unten durch den Stern im Deckelbereich schieben. Danach den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (z.B. für Acrylglas nicht geeignet). Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels nur für 28 Tage in ungeöffneten Behältern verwendbar. Das Haltbarkeitsdatum, sowie die gestrichelten Hinweise der Tränklingsigkeit sind zu beachten und auf ein Etikett zur äußeren Kennzeichnung des Behälters zu übertragen. Nach Entnahme eines Tuchs ist der Behälter wieder sorgfältig und dicht zu verschließen. Die Aufbereitung des Entnahmehalters ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungsanweisung mit einem geeigneten Desinfektionsmittel durchzuführen. **Einwirkzeiten** (bezogen auf die Tränklingsigkeit):

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 min. TB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terre) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Behälter und Deckel trocken lassen ☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**

☑️ **Behalten und Deckel trocken lassen**