Individuelle Arbeitsanweisung



Manuelle Reinigung von Prothesen und zahntechnischen Werkstücken im Tauchbadverfahren oder Ultraschall



WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigen und Desinfizieren der Wanne oder Ultraschall Angaben zu: Produktname Volumen in Liter Ansatzdatum Konzentration Dokumentation	Vor dem erneuten Ansetzen der Reinigungslösung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! Wanne entleeren Wanne mit Trinkwasser ausspülen ggf. mit geeigneter Bürste reinigen mit Desinfektionstuch Wanne oder Ultraschall vollständig auswischen.	 Kunststoffbürste MinutenWipes, ALPRO MEDICAL GMBH PlastiSept eco Wipes, ALPRO MEDICAL GMBH MaxiWipes reel*, ALPRO MEDICAL
		Fusselfreies Einmaltuch	GMBH mit - MinutenSpray- classic oder - PlastiSept eco, ALPRO MEDICAL GMBH getränkt - BCSan 100, ALPRO MEDICAL GMBH mit getränktem TORK- Tuch

^{*} Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 L MinutenSpray-classic oder bei MaxiWipes reel 1,4 L und bei MaxiWipes-L reel 1,6 L PlastiSept eco ALPRO MEDICAL GMBH

Seite 1 von 4 Stand: 11.05.2020

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Reinigungslösung ansetzen	Arbeitstäglich neu Wechseln bei sichtbarer Verschmutzung (z. B. Trübung, Ausflockung, Bildung von Schlieren)	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! > erst Trinkwasser > dann Konzentrat > und dann Trinkwasser auffüllen	Geeignete Wanne Reinigungslösung 1. Trinkwasser 2. TarClean , ALPRO MEDICAL GMBH 5-20% je nach Verschmutzungsgrad
Vorreinigung	Sofort nach jeder Entnahme aus dem Mund	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! Kontaminationsgeschützter Transport zum Aufbereitungsbereich Abformung, zahntechnische Werkstücke unter fließendem Trinkwasser abspülen	Geeignete Desinfektionswanne mit Deckel oder Geschlossenes Tray Trinkwasser
zahntechnische Werkstücke (z. B. Prothesen, Brücken, Schienen, Mundschutz etc.) reinigen	 Vor dem Transport in das Labor Nach dem Erhalt aus dem Labor 	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! > blasenfreies Einlegen > Abformungen und zahntechnische Werkstücke müssen vollständig mit der Lösung bedeckt sein	 TarClean, ALPRO MEDICAL GMBH je nach Verschmutzungsgrad 5-20% in der Wanne oder Ultraschall

Seite 2 von 4 Stand: 11.05.2020

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Desinfektion Siehe Arbeitsanweisung "Manuelle Instrumenten- reinigung- und Desinfektion im Tauchbad-verfahren" (Nass/Chemisch)"	 Nach dem Reinigen Vor dem Transport in das Labor Nach dem Erhalt aus dem Labor 	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! > blasenfreies Einlegen > Abformungen und zahntechnische Werkstücke müssen vollständig mit der Lösung bedeckt sein.	 BIB-forte eco, ALPRO MEDICAL GMBH 0,5 % - 4 % Desinfektionswanne oder Ultraschall
Abschließend	Nach der Desinfektion	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! Abspülen unter fließendem Trinkwasser trocken blasen	Trinkwasser Druckluft WL-Blow, ALPRO MEDICAL GMBH
Transport		Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! > verpackt zum Fremdlabor > direkte Weiterverarbeitung im eigenen Labor	Geeignete Transportbehälter

Seite 3 von 4 Stand: 11.05.2020

Unterweisung durch:	zur Kenntnis genommen:
Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)	Datum/Unterschrift (Personal)
Datum/Onlerschint (Praxispetreiber)	Datum/Onterscrimt (Personar)
Erstellt von:	aktualisiert am:
Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)	Datum/Unterschrift (Personal)

Seite 4 von 4 Stand: 11.05.2020